

GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI CÓ THAY CHỖM

	Trước phẫu thuật	Hậu phẫu ngày 1	Hậu phẫu ngày sau
Triệu chứng – Thăm khám	<ul style="list-style-type: none"> ○ Đau, mất vận động chủ động chân gãy. ○ Giảm đau ○ Bó bột đùi bàn chân/nẹp chống xoay 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vết mổ vùng xương đùi ○ Duy trì nẹp chống xoay chân gãy ○ Ấn uống bình thường 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vết mổ vùng xương đùi ○ Duy trì nẹp chống xoay chân gãy ○ Ấn uống bình thường
Cận lâm sàng	<ul style="list-style-type: none"> ○ Xét nghiệm máu tiền phẫu ○ Xquang xương gãy trước mổ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Xquang xương gãy sau mổ 	Không
Điều trị	<ul style="list-style-type: none"> ○ Phẫu thuật thay chỏm xương đùi bên gãy 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Thuốc giảm đau, kháng viêm ○ Thuốc kháng đông ○ Theo dõi biến chứng sau mổ ○ Theo dõi ống dẫn lưu 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Thuốc giảm đau, kháng viêm ○ Thuốc kháng đông ○ Theo dõi biến chứng sau mổ ○ Theo dõi ống dẫn lưu

Khái niệm: Là gãy phần cổ giải phẫu xương đùi, nằm trong bao khớp háng. Loại gãy thường gặp ở người già, lâu lành , có nhiều biến chứng.

Nguyên nhân: do chấn thương hoặc do bệnh lí (loãng xương, viêm xương, u xương, ...)

Chăm sóc: Bệnh nhân sẽ được tập vật lí trị liệu và hướng dẫn vận động, sinh hoạt với khớp nhân tạo sẽ tránh biến chứng trật khớp nhân tạo sau mổ.

