

GÃY XƯƠNG CẰNG CHÂN CÓ KẾT HỢP XƯƠNG

	Trước phẫu thuật	Hậu phẫu ngày 1	Hậu phẫu ngày sau
Triệu chứng – Thăm khám	<ul style="list-style-type: none"> o Đau, sưng, đau o Biến dạng, mất vận động chủ động, tiếng lạo xạo ở gãy o Bó bột chân gãy, nẹp căng bàn chân 	<ul style="list-style-type: none"> o Vết mổ vùng xương đùi o Duy trì nẹp căng bàn chân o Ăn uống bình thường 	<ul style="list-style-type: none"> o Vết mổ vùng xương đùi o Duy trì nẹp căng bàn chân o Ăn uống bình thường
Cận lâm sàng	<ul style="list-style-type: none"> o Xét nghiệm máu tiền phẫu o Xquang xương gãy trước mổ 	<ul style="list-style-type: none"> o Xquang xương gãy sau mổ 	Không
Điều trị	<ul style="list-style-type: none"> o Phẫu thuật kết hợp xương đặt trong 	<ul style="list-style-type: none"> o Thuốc giảm đau, kháng viêm o Thuốc kháng đông o Theo dõi biến chứng sau mổ o Theo dõi ống dẫn lưu (nếu có) 	<ul style="list-style-type: none"> o Thuốc giảm đau, kháng viêm o Thuốc kháng đông o Theo dõi biến chứng sau mổ o Theo dõi ống dẫn lưu (nếu có)
<p>Khái niệm: Là loại gãy dưới hành xương của mâm chày và trên hành xương của trần chày, có thể gãy 1 xương chày hoặc mác hoặc cả 2 xương cẳng chân.</p> <p>Nguyên nhân: do chấn thương hoặc do bệnh lí (loãng xương, viêm xương, u xương, ...)</p> <p>Chăm sóc: Bệnh nhân sẽ được tập vật lí trị liệu và hướng dẫn vận động, sinh hoạt với dụng cụ kết hợp xương. Bệnh nhân sẽ được hẹn tái khám định kì để theo dõi tiến trình lành xương và tháo dụng cụ kết hợp xương sau 12 – 18 tháng sau mổ.</p>			