



BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÙU ĐIỆN
KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

**PHIẾU TÓM TẮT
THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ**

RĂNG KHÔN MỌC LỆCH

Răng khôn mọc lệch là gì?

Là tình trạng mọc bất thường về trục, hướng và vị trí của răng khôn, làm cho răng không có chức năng ăn nhai và có thể gây biến chứng.

Những yếu tố nguy cơ của bệnh

Biểu hiện thường gặp của bệnh

- Răng lệch trục
- Răng khôn hàm dưới thường có trục lệch gần hoặc lệch má ở các mức độ khác nhau.
- Răng khôn hàm trên thường lệch phía ngoài.
- Răng có thể bị kẹt bởi cổ răng hàm lớn thứ hai, mặt nhai răng khôn có thể không chạm mặt phẳng cắn.

Khi có biến chứng viêm quanh thân răng hoặc các viêm nhiễm khác thì có các biểu hiện:

- Đau tự nhiên, khá dữ dội vùng góc hàm.
- Có thể có sốt.
- Bệnh nhân khó há miệng nhẹ, ăn nhai đau....
- Vùng sau răng 7 nướu nề đỏ có thể lan ra trụ trước amidan và ngách tiền đình, có thể có viêm loét ở niêm mạc vùng lân cận.
- Nướu ứ đọng, chảy mủ.
- Có thể thấy một hoặc hai nướu răng lộ ra khỏi nướu, bờ nướu có thể loét nhẹ.



BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÙU ĐIỆN
KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

**PHIẾU TÓM TẮT
THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ**

RĂNG KHÔN MỘC LỆCH

	<ul style="list-style-type: none">– Có hạch dưới hàm.
Biến chứng	<ul style="list-style-type: none">– Viêm quanh thân răng cấp.– Tổn thương răng hàm lớn thứ hai.– Áp xe vùng má, áp xe vùng cơ cắn, áp xe vùng dưới hàm, áp xe quanh hàm ngoài....– Viêm tấy tỏa lan vùng hàm mặt.– Nhiễm trùng huyết.
Các xét nghiệm cần làm	Phim X quang: Panorama, Conebeam CT...
Hướng điều trị	<ul style="list-style-type: none">– Nhổ bỏ càng sớm càng tốt để không làm mất xương phía xa răng hàm lớn thứ hai.– Trường hợp cần thiết, phải cắt thân răng hoặc phối hợp với chia tách chân răng để không làm ảnh hưởng đến răng kế cận– Trong một số trường hợp phải tạo vạt niêm mạc và mở xương để lấy răng.
Chế độ theo dõi và phòng ngừa	Khám răng miệng định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời